



# Bolinopsis spp., inkludert *B. infundibulum*




Foto: Erling Svensen (1)




Foto: Joan J. Soto Ángel (2)

## Levesett


Forekommer i det nordlige Atlanterhavet, men også i Stillehavet og i Arktis. De største individene finnes på større dyp og individene cruiser for det meste vertikalt, oppover eller nedover. De karakteristiske frontlappene åpner seg for å konsumere byttedyr. De bruker også klebrige celler på tentaklene for å fange byttedyr.

## Størrelse

2-200 mm.

## Giftighet

Ikke giftig, men svermer kan nå enorme tettheter som tetter igjen merdmasker og gjellene til fisken. Dette hindrer oksygenering og vannutveksling mellom merden og vannet rundt, og kan føre til at fisken kveles.



Data hentet fra artsdatabanken og viser registreringer av arten.

## Utbredelse i Norge

Vestlandet: topp i April-Mai. Forsvinner fra overflaten i juni. Balsfjorden: lave forekomster feb-april. Økning April-Mai, maks i juni, nedgang fra August og svært lite igjen i desember. Mest i øvre 50 m.

(1) <https://artsdatabanken.no/Pages/F37650> / CC BY 4.0 / Small crop

(2) <https://www.artsdatabanken.no/taxon/Bolinopsis%20infundibulum/16279> / CC BY-SA 4.0